

DEFiRON

ORAL ÇÖZELTİ



pharvest

DEFiRON

ORAL ÇÖZELTİ

İÇİNDEKİLER:

Beher ml'de

Demir amonyum sülfat (2 mg aktif demir)	10 mg,
Vitamin B ₁₂ (siyanokobalamin)	0.025 mg,
Vitamin PP (nikotinamid)	20 mg
Kobalt glukonat (0.0065 mg aktif kobalt)	0.05 mg içerir.

KULLANIM ALANLARI

Siğır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde antianemik ve tonik etkili bir destekleyicidir.

- İçeriğindeki kobalt sayesinde kobalt eksikliğine bağlı oluşan pikanın tedavisine yardımcıdır.
- Çeşitli stres durumları (güç doğum, operasyon sonrası vs.) oluşan hemorajik anemi ve bunun yanı sıra kene, uyuz, pire ve bit enfestasyonlarının neden olduğu anemi ve süt emen yavru hayvanlarda demir kullanımının engellenmesinden kaynaklanan anemi tedavisini desteklemek amacıyla kullanılır.
- Paraziter kaynaklı ishal tedavisine yardımcıdır.
- Gelişme geriliği ve kaşektik hayvanların desteklenmesinde,
- Çeşitli kronik hastalıkların tedavisinin desteklenmesinde,
- Hayvanlarda iştah ve ayrıca et ve süt verimlerinin artırılmasına yardımcıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Siğır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde her ay bir defa 3-5 gün boyunca oral yolla ile uygulanır. Süt emen yavrualarda demirin bağlanması engellemek amacıyla, beslenmeden en az 2-3 saat sonra uygulanmalıdır.
- Yavru hayvanlara (kuzu, oğlak ve buzağı) ilk doz doğumdan 10-15 gün sonra uygulanır ve daha sonra ayda bir defa tekrarlanması önerilir.
- Besi siğırı ve koyun ve keçilere her ay bir defa 3-5 gün boyunca.
- Süt hayvanlarında çeşitli stres durumları (güç doğum, operasyon sonrası vs.) hemorajik anemilerde 3-5 gün süreyle
- Kedi ve köpeklerde anemik olgularda tedaviye destek olarak 3-5 gün süreyle uygulanabilir.



UYGULAMA TABLOSU

At-Siğır

Genç: 10 ml Erişkin: 20 ml

Koyun – Keçi:

Genç: 1-2 ml Erişkin: 5 ml

Köpek – Kedi:

Beher kg canlı ağırlık için 1-2 damla

Demir preparatlarının tetrasiklin ve bakır preparatlarıyla beraber kullanımı kontrendikedir.